

## FICHA TÉCNICA

Página: 1 de 2  
Versión: 3  
Fecha Revisión: 04-09-2020

PRODUCTO:  
**BIOCITRUS®CU**



<b>I. Ingrediente Activo</b>	: Biomasa cítrica más cobre.
<b>II. Nombre Químico</b>	: No corresponde
<b>III. Grupo Químico</b>	: Inductor de defensas
<b>IV. Concentración</b>	: Sulfato de cobre pentahidratado acomplejado al 22.4%, extracto cítrico 50%; (p/v).
<b>V. Tolerancia</b>	: Según norma RM 1035 – SAG
<b>VI. Densidad</b>	: 1,1 – 1,3 g/ML
<b>VII. pH</b>	: 1,5 – 3,0
<b>VIII. Formulación</b>	: Concentrado soluble (SL)
<b>IX. Modo de acción</b>	: Foliar
<b>X. T° de almacenamiento</b>	: 5 - 40°C
<b>XI. Proveedor</b>	: CHEMIE S.A.
<b>XII. Características</b>	: <b>BIOCITRUS®CU</b> es un Inductor de defensas natural a base de extracto de cítricos más cobre. Tiene un efecto de inductor de defensas en los cultivos señalados en el cuadro de instrucciones de uso.

**XII. Aplicaciones** :

Cultivo	Dosis L/ha	Época
Vid	1,5 – 2,0	Aplicación foliar en floración, pinta y pre cosecha.
Fresa, Frambuesa, Arándano.	1,5 – 2,0	Aplicar con 2 a 4 flores abiertas, cada 15 días.
Durazno, Damasco, especies forestales	1,5 – 2,0	Aplicar en el periodo de la floración (inicio de flor y plena flor).
Paltos	1,5 – 2,0	Floración y cuajado, cada 7 días.
Cítricos: Limón, naranja, mandarina, pomelo, tangelo.	1,5 – 2,0	En Floración y cuajado cada 7 días.

**XIV. PRECAUCIONES**

: BIOCITRUS® Cu es un producto no corrosivo, no volátil, sin embargo, como medida preventiva se recomienda guardar el producto en su envase original, en un lugar seco y fresco.  
 No vierta BIOCITRUS® Cu directamente a pozos, riachuelos, ríos o lagos.  
 No existe restricción en cuanto al tiempo que deba mediar entre la aplicación e ingreso de personas animales al campo tratado.

**XV. COMPATIBILIDAD**

: BIOCITRUS® Cu es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios y afines. Se ha reportado incompatibilidad con los siguientes productos: Dicofol y Methomyl

**XVI. FITOTOXICIDAD**

: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

Ficha técnica válida para Perú.