PRODUCTO:
FERTICHEM® 11-8-6

CHEMIE® Innovación Agroveterinaria

I.	**Nombre Comercial**	: Fertichem® 11-8-6
II.	**Ingrediente Activo**	: Nitrógeno, fósforo, potasio.
III.	**Tipo**	: FERTILIZANTES FOLIARES CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS
IV.	**Concentración**	:

Nitrógeno (N) ..... 11,00 % p/v
Fósforo (P_2O_5) ..... 8,00% p/v
Potasio (K_2O) ..... 6,00% p/v
Hierro (Fe) ..... 0,02 % p/v
Manganeso (Mn) ..... 0,03% p/v
Zinc (Zn) ..... 0,003% p/v
Cobre (Cu) ..... 0,005 % p/v

V.	**Densidad**	: 1,1 – 1,3 g/ml
VI.	**pH**	: 3,0 – 5,0
VII.	**Formulación**	: Concentrado Soluble, SL
VIII.	**Modo de Acción**	: Absorción foliar y radicular
IX.	**Proveedor**	: Chemie Agroveterinaria® S.A.C.
X.	**Autorización SENASA**	: N/A
XI.	**Características**	: FertiChem® 11-8-6 es un fertilizante foliar de formulación líquida a base de nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos quelatizados, que sirven como complemento ideal a la fertilización del suelo. Además, está acomplejado con Gluconato de sodio y está enriquecido por componentes a base de aminoácidos y algas marinas. Los aminoácidos son los constituyentes principales de las proteínas en las plantas, estimulan el crecimiento y desarrollo vegetal y ayudan a superar situaciones de estrés medio ambiental. Las algas marinas proveen a la planta de promotores naturales de crecimiento.
XII.	**Compatibilidad**	: No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible con los productos fitosanitarios, sin embargo, en caso de duda se recomienda realizar pruebas previas a la premezcla.
XIII.	**Fitotoxicidad**	: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

XIV. Precauciones : Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar seguro, fresco y seco en su envase original debidamente cerrado y etiquetado, lejos de alimentos, medicinas. Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas.
Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C.

XV. Instrucciones de uso:

CULTIVO	DOSIS (L/200 L)	DOSIS (L/Ha)	RECOMENDACIONES
Uva de mesa.		5 – 10	Aplicar al inicio del brotamiento y repetir las aplicaciones entre 7 y 10 días.
Palto		5 – 10	Aplicar al inicio del cuajado y repetir las aplicaciones de 3 a 4 veces.
Mango	0,5 – 1,0		Aplicar al inicio del cuajado y repetir las aplicaciones de 3 a 4 veces.
Arándano, fresa, frambuesa.	0,5 – 1,0		Aplicar al inicio del brotamiento y realizar de 3 a 4 aplicaciones.
Limón, naranja, mandarina, tangelo.		5 – 10	Aplicar a partir del cuajado de los frutos o durante los ciclos de brotamiento.
Papa.	1 - 2		1ª A los 25 días de la misma siembra. 2ª 15 a 20 días después de la primera. 3ª 15 a 20 días después de la segunda
Lechuga Col, brócoli Apio.	0,5 – 1,0		1° Cuando ya tenga hojas bien formadas. 2ª 15 días después de la primera. 3ª 15 a 20 días después de la segunda.
Cebolla, ajo Alcachofa.	0,5 – 1,0		1ª Cuando la planta tenga de 8 a 10 cm de altura. 2ª 20 días después de la primera. 3ª 20 días después de la segunda.
Melón, sandía, zapallo, pepinillo.	0,5 – 1,0		1ª Cuando la planta tiene 4 hojas verdaderas. 2ª 15 días después de la primera. 3ª 15 días después de la segunda.
Tomate	0,5 – 1,0		1ª 25 días después del trasplante. 2ª 15 días después de la primera. 3ª 15 días después de la segunda.

Pimiento, ají, páprika. Piquillo.			
Frejol, arveja, holantao, vainita.	0,5 – 1,0		1ª A los 20 días de la siembra. 2ª 15 días después de la primera. 3ª 15 días después de la segunda.
Banano	1 - 2		Aplicar al inicio del período vegetativo.
Espárrago	0,5 – 1,0		Aplicar al inicio del período vegetativo, repetir cada 10 a15 días.
Arroz	0,5 – 1,0		Aplicar al inicio del macollamiento y a los 15 días después repetir la aplicación.

Ficha técnica válida para Perú.