PRODUCTO:
FERTICHEM® Ca

CHEMIE
Innovación Agroveterinaria

I.	**Nombre Comercial**	: Fertichem® Ca
II.	**Ingrediente Activo**	: Calcio, nitrógeno, microelementos.
III.	**Tipo**	: FERTILIZANTES FOLIARES CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS
IV.	**Concentración**	:

Calcio (Cao) .....22,50 % p/v
Nitrógeno ..... 10,50 % p/v
Magnesio (MgO) ..... 3,00% p/v
Boro (B) ..... 0,06 % p/v
Cobre ..... 0,15 % p/v
Manganeso ..... 0,15 % p/v
Molibdeno (Mo)..... 0,0015 % p/v
Hierro (Fe) ..... 0,0750 % p/v
Zinc (Zn) ..... 0,03 % p/v

V.	**Densidad**	: 1,4 – 1,6 g/ml
VI.	**pH**	: 1,0 – 3,0
VII.	**Formulación**	: Concentrado Soluble, SL
VIII.	**Modo de Acción**	: Absorción foliar y radicular
IX.	**Proveedor**	: Chemie Agroveterinaria ®S.A.C.
X.	**Autorización SENASA**	: N/A
XI.	**Características**	: FertiChem ® Ca es un fertilizante foliar formulado como suspensión que tiene un alto contenido de calcio (proveniente de nitrato de calcio que promueve la mejor absorción de calcio), además presenta magnesio, macro y micronutrientes, para un crecimiento balanceado de la fruta previniendo además las deficiencias de calcio, dando consistencia y firmeza a hojas, tallos, flores y especialmente a frutos otorgándoles así un mayor peso y mejor conservación. Fertichem ® Ca está acomplejado con Gluconato de sodio

FertiChem ® Ca evita los desórdenes filológicos causados por deficiencias de Calcio, gracias a su rápida asimilación y transporte por la planta, además de estar enriquecido con Mg, B, Cu, Mn, Mo, Fe y Zinc que complementan la actividad del calcio en las actividades metabólicas de la planta.

XII. Compatibilidad : Se puede mezclar con gran parte de los productos fitosanitarios de uso frecuente, no obstante, en caso de duda, se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad.

XIII. Fitotoxicidad : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

XIV. Precauciones : Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar seguro, fresco y seco en su envase original debidamente cerrado y etiquetado, lejos de alimentos, medicinas. Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas.
Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C.

XV. Instrucciones de uso:

CULTIVO	DOSIS (ml/200 L)	Dosis (l/ha)	RECOMENDACIONES
Uva de mesa.	400 - 600	2 - 3	Aplicar antes de la floración, al final del cuajado, al inicio de la pinta y 7 días después de esta último.
Mango	300 - 400	3 - 4	Aplicar al cuajado del fruto y repetir las aplicaciones cada 15 días.
Arándanos. Fresa	200 - 300	2 - 3	Aplicar a la floración y al cuajado de los frutos.
Banano	400 - 600	2 - 3	Inicio de formación de vela, inicio de floración, 15 días después de la última.
Limón, naranja, mandarina, tangelo, clementina.	200 - 300	2 - 3	Aplicar al cuajado y repetir las aplicaciones cada 15 días.
Palto	200 - 300	2 - 3	Aplicar al cuajado y repetir las aplicaciones cada 15 días.
Pitahaya	700 - 800	4 - 5	Aplicar al inicio de la floración y repetir 3 a 4 aplicaciones después del cuajado cada 15 días.
Olivo	700 - 800	4 - 5	Antes de la floración, en cuajado y al inicio de cambio de color y/o maduración.
Ají, paprika, pimiento, piquillo. Tomate	200 - 300	2 - 3	Aplicar desde el cuajado de los frutos y repetir las aplicaciones cada 15 días.
Alcachofa	500	2-3	Iniciar las aplicaciones previo a la aplicación del ácido giberélico.

Papa.	200 - 300	2 - 3	Aplicar desde el inicio de la tuberización y repetir las aplicaciones cada 15 días.
Cebolla, ajo.	200 - 300	2 - 3	Aplicar a partir de los 20 días y repetir las aplicaciones cada 15 días.

Ficha técnica válida para Perú.