

FICHA TÉCNICA

Página 1 de 3
Revisión: 15
Fecha Revisión: 02-06-2023

PRODUCTO:
FORTICHEM Cal Bo



I.	Nombre Comercial	: FORTICHEM Cal Bo
II.	Ingrediente Activo	: Calcio, boro.
III.	Tipo	: FERTILIZANTES FOLIARES CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS
IV.	Concentración	: Calcio (CaO) 12,00 % p/v Boro 4,00 % p/v *acomplejado con Gluconato de Sodio y enriquecido algas y aminoácidos.
V.	Densidad	: 1,2 – 1,4 g/ml
VI.	pH	: 3,0 – 5,0
VII.	Formulación	: Concentrado Soluble, SL
VIII.	Modo de Acción	: Absorción foliar y radicular
IX.	Proveedor	: Chemie Agroveterinaria ® S.A.C
X.	Autorización SENASA	: N/A
XI.	Características	: FORTICHEM Cal Bo Es un corrector de deficiencias a base de Calcio (Ca) y Boro (B), acompañado con Gluconato de sodio y enriquecido con aminoácidos y algas, formulado para evitar posibles deficiencias de estos elementos en todos los cultivos. Previene la caída de flores y frutos, la presencia de acorchamiento en el manzano, pudrición apical en tomate, pimiento, pepino y la necrosis foliar en la lechuga. Enriquecido con ácidos fúlvicos, algas marinas y aminoácidos. Mejora la respiración y los procesos de transformación y translocación de azúcares y almidones de las hojas a los puntos de reserva debido a que regula la cantidad de agua dentro de la planta.
XII.	Compatibilidad	: Se puede mezclar con gran parte de los productos fitosanitarios de uso frecuente, no obstante, en caso de duda, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad.
XIII.	Fitotoxicidad	: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.
XIV.	Precauciones	: Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar seguro, fresco y seco en su envase original debidamente cerrado y etiquetado, lejos de alimentos, medicinas. Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas.

FICHA TÉCNICA

Página 2 de 3
Revisión: 15
Fecha Revisión: 02-06-2023

PRODUCTO:
FORTICHEM Cal Bo



Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C.

XV. Instrucciones de uso:

CULTIVO	DOSIS (L/200 L)	Dosis L/ Ha	RECOMENDACIONES
Uva de mesa.		3 – 5	Aplicar desde que la uva tenga 3 mm de diámetro de 3 a 4 veces cada 15 días.
Arándano, fresa, frambuesa.	0,5 – 1,0		Aplicar a partir del cuajado del fruto. Realizar de 3 a 4 aplicaciones.
Limón, naranja, mandarina, tangelo.		3 - 5	Aplicar a partir del cuajado de los frutos. Realizar de 2 a 3 aplicaciones.
Palto		3 – 5	Aplicar a partir del cuajado de los frutos. Realizar de 2 a 3 aplicaciones.
Mango	0,5 – 1,0		Aplicar a partir del cuajado de los frutos. Realizar de 2 a 3 aplicaciones.
Granado	0,5 – 1,0		Aplicar a partir del cuajado de los frutos. Realizar de 2 a 3 aplicaciones.
Papa	0,5 – 1,0		Aplicación luego de la floración cada 15 días haciendo dos aplicaciones como mínimo.
Tomate ají, pimiento, paprika, piquillo.	0,5 – 1,0		Aplicar antes de la floración y en plena fructificación. Realizar tres aplicaciones como mínimo.
Alcachofa	0,5 – 1,0		Aplicar a partir de la formación de los capítulos.
Espárrago	0,5 – 1,0		Aplicar a partir del tercer brote cada 15 días. Repetir la aplicación 3 a 4 veces.

FICHA TÉCNICA

Página 3 de 3
Revisión: 15
Fecha Revisión: 02-06-2023

PRODUCTO:
FORTICHEM Cal Bo



Pitahaya	0,5 – 1,0		Al inicio de la floración.
Banano	0,5 – 1,0		Realizar de 5 a 7 aplicaciones a partir de la aparición de la inflorescencia.

Ficha Técnica válida para Perú.