

FICHA TÉCNICA

Página 1 de 2
Revisión: 14
Fecha Revisión: 02-06-2023

PRODUCTO:
MAD - 100



I.	Nombre Comercial	: MAD-100
II.	Ingrediente Activo	: Fósforo y potasio
III.	Tipo	: PRODUCTO MISCELÁNEO
IV.	Concentración	: Fósforo (P ₂ O ₅)24,50 % p/v Potasio (K ₂ O)31,00 % p/v Boro (B)0,10% p/v Manganeso (Mn).....0,10% p/v Molibdeno (Mo).....0,01% p/v
V.	Densidad	: 1,3 – 1,5 g/ml
VI.	pH	: 7,0 – 8,0
VII.	Formulación	: Concentrado Soluble, SL
VIII.	Modo de Acción	: Absorción foliar
IX.	Proveedor	: Chemie Agroveterinaria ®S.A.C.
X.	Autorización SENASA	: N/A
XI.	Características	: MAD-100 es un fertilizante foliar promotor de la maduración de los frutos (induce la coloración). Está equilibrado por una fórmula que permite el agregado de fósforo y potasio en las proporciones requeridas, sin tener efecto antagónico alguno, ni provocar el llamado “efecto del fósforo” = efecto acumulativo que provoca la no absorción de otros elementos a dosis altas de fósforo (siendo ésta una gran ventaja sobre los hipofosfitos comunes). MAD-100, posee B, Mn y Mo lo que favorece, en conjunto con el potasio, un balanceado incremento del porcentaje de azúcar, una mayor coloración, maduración uniforme de los frutos y en forma general mejor calidad estética al fruto. MAD-100 evita un excesivo crecimiento vegetativo, originando una mayor retención de flores y frutos y mejor estado general de plantas y árboles.
XII.	Compatibilidad	: Se debe evitar su mezcla con productos cúpricos, aceites minerales y compuestos de fuerte reacción alcalina.
XIII.	Fitotoxicidad	: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

FICHA TÉCNICA

Página 2 de 2
Revisión: 14
Fecha Revisión: 02-06-2023

PRODUCTO:
MAD - 100



- XIV. Precauciones** : Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar seguro, fresco y seco en su envase original debidamente cerrado y etiquetado, lejos de alimentos y medicinas. Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas.
Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 - 40 °C

XV. Instrucciones de uso:

CULTIVO	FOLIAR (L/Ha)	RECOMENDACIONES
Uva de mesa.	12 - 15	Repartir dosis en 3 aplicaciones, desde el inicio de la pinta (bayas blandas) con intervalos de 7 días.
Arándano.	6 - 8	Repartir dosis en 3 aplicaciones, cada 15 días desde el cambio de color de fruto.
Mandarina, limón, naranja, tangelo.	10 - 15	Repartir dosis en 3 aplicaciones, cada 7 días, desde el cambio de color.
Mango	10 - 15	Repartir dosis en 3 aplicaciones, cada 7 días, desde el cambio de color.
Melón, sandía, pepino.	4 - 6	Repartir dosis en 2 aplicaciones cada 7 días desde 35 días antes de la cosecha.
Granado	15	Repartir dosis en 2 a 3 aplicaciones, cada 7 días, desde el quiebre de color.
Banano.	10 - 15	Repartir dosis en 3 aplicaciones, cada 7 días, desde el cambio de color.
Pimiento, paprika, ají, piquillo. Tomate	4 - 6	Repartir dosis en 2 aplicaciones desde el cambio de color hasta cosecha.
Cebolla, ajo.	4 - 6	Repartir dosis en 2 aplicaciones cada 7 días desde el llenado de bulbo.
Papa.	4 - 6	Repartir dosis en 2 aplicaciones desde el inicio de tuberización.

Ficha técnica válida para Perú.