

## FICHA TÉCNICA

Página 1 de 2  
Revisión: 16  
Fecha Revisión: 21-06-2023

PRODUCTO:  
**FERTICHEM® Mn**



I.	Nombre Comercial	: FERTICHEM® Mn
II.	Ingrediente Activo	: Manganeso y nitrógeno
III.	Tipo	: FERTILIZANTES FOLIARES CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS
IV.	Concentración	: Manganeso (Mn).....12,50 % p/v Nitrógeno (N) .....3,10 % p/v *Acomplejado con Gluconato de sodio y enriquecido con aminoácidos y algas.
V.	Densidad	: 1,3 – 1,5 g/ml
VI.	pH	: 1,5 – 3,0
VII.	Formulación	: Concentrado Soluble, SL
VIII.	Modo de Acción	: Absorción foliar y radicular
IX.	Proveedor	: Chemie Agroveterinaria ®S.A.C.
X.	Autorización SENASA	: N/A
XI.	Características	: FERTICHEM® Mn fertilizante de acción foliar, formulado en base a Manganeso, acomplejado con Gluconato de sodio y repotenciado con Aminoácidos, Algas Marinas.  FERTICHEM® Mn actúa como activador de enzimas esenciales en los procesos de crecimiento.  FERTICHEM® Mn Apoya al hierro en la formación de clorofila, acelera la germinación y la maduración, aumenta el aprovechamiento del calcio, el magnesio y el fósforo, catalizador en la síntesis de clorofila.
XII.	Compatibilidad	: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, pero se recomienda realizar pruebas de compatibilidad de mezclas. Al mezclar FERTICHEM® Mn con productos fitosanitarios, debe ser incorporado como último componente de la mezcla. Las mezclas con fitosanitarios deben ser aplicadas inmediatamente después de su preparación y agitarse constantemente.
XIII.	Fitotoxicidad	: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.
XIV.	Precauciones	: Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar seguro, fresco y seco en su envase original debidamente cerrado y etiquetado, lejos de alimentos, medicinas. Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas. No existe restricción en cuanto al tiempo de reingreso al área tratada Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C.

## FICHA TÉCNICA

Página 2 de 2  
Revisión: 16  
Fecha Revisión: 21-06-2023

PRODUCTO:  
**FERTICHEM® Mn**



### XV. Instrucciones de uso:

Aplicación por fertirrigación: En suelos con menos de 6,5 pH usar dosis entre 3 – 5 L/Ha, dependiendo del grado de deficiencia de Manganeso. Aplicar cada 3 a 4 semanas.

CULTIVO	CONCENTRACION (mL/200 L agua)	DOSIS (L/Ha)	RECOMENDACIONES
Uva de mesa.		1 – 1,5	Antes de la floración, al final del cuajado, al inicio de la pinta y 7 días después de esta última.
Limón, naranja, mandarina, tangelo.		1 – 1,5	Antes de la floración, en cuajado y al inicio de cambio de color y/o maduración.
Arándano, fresa, frambuesa.	200 - 300		Aplicar al inicio de la floración y repetir 3 a 4 aplicaciones después del cuajado cada 15 días.
Palto.		1 – 1,5	Antes de la floración, en cuajado y al inicio de cambio de color y/o maduración.
Mango	200 - 300		Antes de la floración, en cuajado y al inicio de cambio de color y/o maduración.
Granado.	200 - 300		Aplicar al brotamiento, floración y cuajado.
Alcachofa, Paprika, pimiento, piquillo, ají. Tomate Melón, sandía, pepinillo.	300 - 400		Aplicar desde 20 - 35 días del trasplante o emergencia de la semilla y en 2-3 ocasiones cada 10 días.
Papa	300 - 400		Aplicar desde el inicio de la tuberización.
Cebolla, ajos.	300 - 400		Aplicar desde 20 días del trasplante o emergencia de la semilla, en 3 a 5 ocasiones cada 15 días.

Ficha técnica válida para Perú.